

### Популярные препараты трехвалентного железа для приема внутрь

Наименование препарата	Состав	Форма выпуска	Элементарного железа (III)	Средняя суточная доза для взрослых для лечения ЖДА	Лекарственные взаимодействия (сделать интервал 2-3 часа)	Взаимодействие с пищей, алкоголем
<b>Феррум Лек</b>	Железа гидроксид полимальтозат	Сироп	5 мл – 50 мг	10-30 мл во время или после еды (смешать с фруктовым или овощным соком, детским питанием)	Не выявлено	Не выявлено
		Таблетки жевательные	100 мг	2-3 таб. во время или сразу после еды		
<b>Биофер</b>	Железа гидроксид полимальтозат, фолиевая кислота	Таблетки жевательные	железа -100 мг фолиевой кислоты – 350 мкг	1 таб. 1-3 раза во время или сразу после еды	Не выявлено	Не выявлено
<b>Мальтофер Фол</b>					Одновременный прием с хлорамфениколом (Левомецетином) снижает лечебный эффект	

<b>Мальтофер</b>	Железа гидроксид полимальтозат	Капли	1 мл (20 капель) – 50 мг	40-120 капель во время или после еды (смешать с фруктовым или овощным соком, безалкогольным напитком)	Не выявлено	Не выявлено
		Сироп	5 мл – 50 мг	10-30 мл во время или после еды (смешать с фруктовым или овощным соком, безалкогольным напитком)		
		Таблетки жевательные	100 мг	1-3 таб. во время или после еды		
<b>Ферлатум</b>	Железа протеин сукцинилат	Раствор для приема внутрь	1 флак. – 40 мг железа	1-2 флакона до или после еды, запить водой	Уменьшает всасывание тетрациклинов. Хлорамфеникол увеличивает продолжительность лечения препаратом железа. Антациды уменьшают всасывание железа. Аскорбиновая кислота улучшает всасывание железа.	Не выявлено

<b>Ферлатум Фол</b>	Железа протеин сукцинилат + колпачок- дозатор с кальция фолинатом	Раствор для приема внутрь	1 флак. – 40 мг железа и 185 мкг фолиевой кислоты	1-2 флакона до или после еды, запить водой	Хлорамфеникол увеличивает продолжительность лечения препаратом железа. Антациды уменьшают всасывание железа. Аскорбиновая кислота улучшает всасывание железа.	Не выявлено
---------------------	--	------------------------------	--	--	---	-------------